

RETENTION AIGUE D'URINES

Définitions

Impossibilité brutale et totale d'uriner

- obstacle urétral
- acontractilité vésicale


Plus rare chez la fille

Diagnostic

- Douleur hypogastrique
- Besoin d'uriner
- Chez nourrisson, agitation et signes digestifs, couches sèches
- Présence globe vésical
 - masse hypogastrique palpable, remontant à l'ombilic, convexe en haut, mate, douloureuse
 - si doute avec tumeur pelvienne, échographie
- Diagnostic différentiel : anurie

Etiologies

- Obstruction cervico-urétrales
 - traumatisme de l'urètre
 - obstacles urétraux congénitaux (diverticule, polype)
 - urétérocèles
 - calcul enclavé dans urètre
 - corps étranger
 - post-opératoire chirurgie urètre (hypospadias)
 - tumeur pelvienne
 - constipation (fécalome) ++++



Etiologies

- **Acontractilité vésicale**
 - chirurgie pelvienne
 - maladies neurologiques aiguës
 - médicaments
 - morphiniques, atropiniques, neuroleptiques
- **Rétention volontaire (appréhension de brûlures mictionnelles)**
 - après explorations (cystographie, endoscopie)
 - post-opératoire (chirurgie du pénis et de l'urètre)

Conduite à tenir

- Traitement de la cause si possible
 - lavement évacuateur ...
- Drainage vésical fonction de l' étiologie
 - sonde urétrale
 - cathéter sus-pubien
 - vidange lente de la vessie pour éviter hématurie
- ECBU
- Surveillance du drainage