

Urétrorragies

Définition

- Emission de sang par le méat urétral en dehors des mictions
- Origine sous-sphinctérienne
- Rare chez la fille, à différencier d'une hémorragie vulvo-vaginale

Diagnostic

- **Présentation**
 - Taches de sang dans les sous-vêtements
 - Gouttes de sang après la miction
- **Interrogatoire**
 - circonstances de survenue
 - contexte traumatique
 - signes associés : douleurs, dysurie ...
- **Examen clinique soigneux**

Etiologies traumatiques

– traumatisme urètre postérieur

- fracture du bassin
- rétention d'urines
- drainage sus-pubien (sondage interdit)

– traumatisme urètre antérieur


- bilan endoscopique ?
- Sanson S, Ballouhey Q, Abbo O, Galinier P. [Pediatric anterior urethral injuries: time to take stock]. Prog Urol. 2013 May;23(6):410-4.

– accident de sondage

- lésion superficielle
- fausse route plus complexe

Etiologies non traumatiques

- calcul
- angiome (Klippel-Trépan Syndrome)
- méatite
- diverticule (magna)



Urétrite idiopathique du garçon

urétrite postérieure

problème contraignant

garçon prépubère

clinique

Urétrorragies

brûlures mictionnelles

examens complémentaires

ECBU normal

Echographie normale

Cystographie normale en début d'évolution

endoscopie

lésions inflammatoires du cul de sac bulbaire avec fausses membranes

Evolution

- guérison après un temps variable, de quelques semaines à plusieurs années
- possibilité d'évoluer vers une sténose serrée

Traitement

symptomatique : antalgiques, anti-inflammatoires

Etiologies

- recherche bactériennes ou virales négatives
- allergie ?
- microtraumatismes ?
- attitudes de rétention urinaire ?

En pratique

Si symptomatologie pure

- endoscopie inutile sauf grande anxiété des parents
- traitement symptomatique à la demande
- surveillance des mictions, clinique et débitmétrique

Si doute ou évolution vers la sténose

- endoscopie